

# Schéma monitorovania pečeňových funkcií pri užívaní Valdoxanu

## Valdoxan 25 mg

- Pred začatím liečby ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l
- Týždeň 3 ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l
- Týždeň 6 ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l
- Týždeň 12 ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l
- Týždeň 24 ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l

Prosím, vykonajte test kedykoľvek, keď je klinicky indikované.

- V prípade zvýšenia dávky na 50 mg, znovu začať monitorovaciu schému.

- Začatie liečby ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l
- Týždeň 3 ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l
- Týždeň 6 ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l
- Týždeň 12 ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l
- Týždeň 24 ALT ..... $\mu$ kat/l  
AST ..... $\mu$ kat/l

Prosím, vykonajte test kedykoľvek, keď je klinicky indikované.

Meno pacienta \_\_\_\_\_

Dátum začatia liečby: \_\_\_\_\_

**Symptómy alebo akýkoľvek prejav možného poškodenia pečene\***

**Sérové transaminázy (ALT, AST)**

ALT a/alebo AST  
> 3-násobok hornej hranice  
normálneho rozmedzia

ALT a/alebo AST  
≤ 3-násobok hornej hranice  
normálneho rozmedzia

**Normálne**

**Symptómy alebo akýkoľvek prejav možného poškodenia pečene\***

**Žiadny symptóm alebo prejav poškodenia pečene**  
Zopakujte testy pečeňových funkcií do 48 hodín

ALT a/alebo AST  
> 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia

ALT a/alebo AST  
≤ 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia

**~~Ukončíte liečbu~~**

- Mali by sa vykonať testy pečeňových funkcií (vrátane transamináz)

**~~Ukončíte liečbu~~**

- Opakujte testy pečeňových funkcií pravidelne, kým sa sérové transaminázy nevrátia k normálu

**Pokračujte v liečbe**

- Dodržujte časový harmonogram pečeňových monitorovacích testov

\*Ako tmavý moč, svetlo sfarbená stolica, zožltnutie kože/očí, bolesť v pravej hornej časti brucha, pretrvávajúca vzniknutá a nevysvetliteľná únava