

VALDOXAN 25 MG – DÁTUM PRVÉHO UŽITIA:	
Intervaly krvných testov pečeneových enzýmov	Dátum
Dátum prvého testu (pred začatím liečby)	
Dátum druhého testu (po približne 3 týždňoch liečby)	
Dátum tretieho testu (po približne 6 týždňoch liečby)	
Dátum štvrtého testu (po približne 3 mesiacoch liečby)	
Dátum piateho testu (po približne 6 mesiacoch liečby)	

Váš lekár môže rozhodnúť o vykonaní ďalších krvných testov.

ZVÝŠENIE DÁVKY NA 50 MG - DÁTUM PRVÉHO UŽITIA:	
Intervaly krvných testov pečeneových enzýmov	Dátum
Dátum testu na začiatku užívania Valdoxanu v dávke 50 mg	
Dátum druhého testu (po približne 3 týždňoch liečby)	
Dátum tretieho testu (po približne 6 týždňoch liečby)	
Dátum štvrtého testu (po približne 3 mesiacoch liečby)	
Dátum piateho testu (po približne 6 mesiacoch liečby)	

Váš lekár môže rozhodnúť o vykonaní ďalších krvných testov.

Nezabudnite si so sebou priniesť túto príručku k lekárovi.

Pre detailnejšie informácie si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa v balení Valdoxanu.

VAL-02-2017-EDU

VALDOXAN®

Odporúčania, ako zabrániť vedľajším účinkom súvisiacim s pečeňou

Valdoxan môže spôsobovať vedľajšie účinky, ktoré môžu zahŕňať zmeny vo fungovaní pečene.

Táto príručka poskytuje odporúčania, ako zabrániť vedľajším účinkom súvisiacim s pečeňou a poradí, čo robiť, ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú počas liečby Valdoxanom.

Pre ďalšie informácie sa poraďte s lekárom.

Valdoxan je antidepresívum, ktoré je účinné v liečbe depresie.

Za účelom optimalizovať vašu lekársku starostlivosť sa riaďte odporúčaniami svojho lekára týkajúcimi sa užívania liečby Valdoxanom (dávka, trvanie liečby, príslušné kontrolné vyšetrenia, ako sú plánované návštevy lekára, analýza krvných testov).

ČO ROBIŤ PRED UŽITÍM VALDOXANU?

- **Povedzte svojmu lekárovi ak viete, že vaša pečeň nefunguje správne, v takom prípade neužívajte Valdoxan.**
- **Existujú aj iné dôvody, prečo Valdoxan môže byť pre vás nevhodný.** V nasledujúcich prípadoch sa, prosím, poraďte so svojim lekárom:
 - ak ste už niekedy mali problémy s pečeňou,
 - ak máte obezitu alebo nadváhu,
 - ak máte cukrovku,
 - ak nadmerne konzumujete alkohol,
 - ak užívate iné lieky (niektoré sú známe tým, že ovplyvňujú pečeň).

ČO ROBIŤ, ABY STE SA VYHLI PROBLÉMOM S PEČEŇOU POČAS VAŠEJ LIEČBY?

■ Chodte na pravidelné krvné testy

• Prečo?

Váš lekár má **pred začatím liečby** skontrolovať, či vaša pečeň funguje správne. Krvné testy urobené vaším lekárom mu ukážu, **ako pracuje vaša pečeň** a rozhodne, či je pre vás Valdoxan vhodný.

Počas liečby Valdoxanom môžu mať niektorí pacienti zvýšenú hladinu pečeňových enzýmov v krvi. Hladiny týchto enzýmov poukazujú na správne alebo nesprávne fungovanie pečene a sú nevyhnutné pre lekára pri monitorovaní liečby.

• Kedy?

	Pred začatím liečby alebo pri zvýšení dávky	Približne 3 týždňov liečby	Približne 6 týždňov liečby	Približne 3 mesiace liečby	Približne 6 mesiacov liečby
Krvné testy	✓	✓	✓	✓	✓

Ak vám lekár zvýši dávku na 50 mg, testy sa musia znovu zopakovať podľa schémy.

Nezabudnite priniesť lekárovi svoje **PRIPOMENUTIE POŽADOVANÝCH KRVNÝCH TESTOV** (pozri ďalšiu stranu).

Ak máte akékoľvek informácie, že sa vaše krvné pečeňové enzýmy zvýšili, okamžite informujte svojho lekára.

■ Všímajte si príznaky svedčiace na problémy s pečeňou

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, vaša pečeň nemusí pracovať správne:

- zožltnutie kože/očí
- stmavnutie moču,
- svetlo sfarbená stolica,
- bolesť v hornej časti brucha,
- nezvyčajná únava (najmä v súvislosti s vyššie uvedenými príznakmi)

Vyhľadajte okamžitú pomoc lekára, ktorý vám poradí, ako ďalej postupovať v liečbe.

PRIPOMENUTIE POŽADOVANÝCH KRVNÝCH TESTOV

Zapamätajte si

Pri užívaní Valdoxanu je dôležité, aby ste podstúpili pravidelné krvné testy.

Tabuľka na ďalšej strane vám pomôže sledovať požadované krvné testy.